

Proaktiv®



480 mg Hartkapsel

Wirkstoff: Weidenrinden-Trockenextrakt

Indikationsgruppe

Pflanzliches Arzneimittel bei Schmerzen.

Anwendungsgebiete

Rheumatische Beschwerden, Kopfschmerzen.

Gegenanzeigen

Proaktiv® darf nicht angewendet werden bei Magen- und Darmgeschwüren, bei bekannter Überempfindlichkeit gegen Salicylate, gegen andere Entzündungshemmer/Antirheumatika oder bei Neigung zu Allergien, bei Asthma bronchiale sowie spastischen Bronchitiden.

Proaktiv® darf nicht angewendet werden bei Kindern unter 12 Jahren sowie in der Schwangerschaft und in der Stillzeit.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung

Wenn Patienten in der Vergangenheit unter Magen-Darm-Geschwüren gelitten haben, und bei vorgeschädigter Niere oder schweren Leberfunktionsstörungen, soll Proaktiv® nur nach Rücksprache mit einem Arzt angewendet werden. Im Verlauf einer Langzeitbehandlung müssen regelmäßige Blutbild- und Kontrollen des Harnsäurespiegels erfolgen. Bei Patienten mit Glucose-6-Phosphat-Dehydrogenase-Mangel (ererbte Enzymerkrankung) besteht das Risiko einer hämolytischen Anämie (vorzeitiger Zerfall der roten Blutkörperchen).

Zur Anwendung bei Patienten mit Blutgerinnungsstörungen im Sinne einer vermehrten Blutungsneigung liegen keine Untersuchungen vor. Diese Patienten sollten das Arzneimittel nicht ohne ärztlichen Rat einnehmen.

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und anderen Mitteln

Die von anderen Salicylaten bekannten Wechselwir-

kungen können auch bei der Anwendung von Proaktiv® auftreten, insbesondere können die Wirkung von Mitteln zur Senkung der Gerinnungsfähigkeit des Blutes (Antikoagulantien, z.B. Cumarin-Derivate und Heparin), das Risiko einer Magen-Darm-Blutung bei gleichzeitiger Behandlung mit Kortikoiden (z.B. Prednisolon) oder bei gleichzeitigem Alkoholkonsum wie auch die Wirkung von einzunehmenden blutzuckersenkenden Medikamenten erhöht werden. Die Wirkung von Medikamenten zur Steigerung der Harnsäureausscheidung kann vermindert werden.

Dosierung, Art und Dauer der Anwendung

Soweit nicht anders verordnet, nehmen Erwachsene und Heranwachsende über 12 Jahren 2mal täglich 1 Hartkapsel ein.

Proaktiv® sollte morgens und abends mit reichlich Flüssigkeit eingenommen werden.

Die Dauer der Anwendung ist nicht grundsätzlich begrenzt.

Bei allen unklaren oder länger dauernden Beschwerden sollte ein Arzt befragt werden.

Überdosierung und andere Anwendungsfehler

Wenn Patienten Proaktiv® in zu großen Mengen eingenommen haben (beabsichtigte oder versehentliche Überdosierung), sollen sie einen Arzt benachrichtigen. Dieser kann über gegebenenfalls erforderliche Maßnahmen entscheiden.

Vergiftungen mit Proaktiv® sind bisher nicht bekannt geworden. Bei Einnahmen zu großer Mengen von Proaktiv® können die unter Nebenwirkungen beschriebenen Beschwerden möglicherweise verstärkt auftreten.

Wenn Patienten zu wenig Proaktiv® eingenommen oder die Einnahme vergessen haben, sollen sie beim nächsten Mal nicht etwa die doppelte Menge Proaktiv® einnehmen, sondern mit der Einnahme, wie von ihrem Arzt verordnet oder in der Dosierungsanleitung beschrieben, fortfahren.

Nebenwirkungen

Gelegentlich können Überempfindlichkeitsreaktionen der Haut (z.B. als Juckreiz, Hautrötung, Ausschlag, Nesselsucht) auftreten. Sehr selten sind schwere allergische Reaktionen (Asthma, Kreislaufkollaps, allergischer Schock) nach Einnahme von Weidenrinde beobachtet worden. Bei empfindlichen Patienten sind Magen-Darm-Beschwerden wie Übelkeit und Magenschmerzen möglich.

Bei Auftreten von Nebenwirkungen sollte das Präparat abgesetzt und ein Arzt aufgesucht werden. Dieser kann über den Schweregrad und gegebenenfalls erforderliche weitere Maßnahmen entscheiden.

Bei den ersten Anzeichen einer Überempfindlichkeitsreaktion darf Proaktiv® nicht nochmals eingenommen werden.

Hinweis:

Beobachten Patienten Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, sollen sie diese ihrem Arzt oder Apotheker mitteilen.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels

Proaktiv® darf nach Ablauf des auf dem Behältnis und der äußeren Umhüllung angegebenen Verfalldatums nicht mehr verwendet werden.

Nach Anbruch des Behältnisses ist Proaktiv® 3 Monate haltbar.

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Apothekenpflichtig
Zul.-Nr. 55511.00.00

Wertvolle Informationen für Ihre Gesundheit

Pflanzliche Extrakte bestehen aus vielen Inhaltsstoffen, die einen Beitrag zur Wirkung leisten können. Bei der in Proaktiv® enthaltenen Weidenrinde sind besonders das Salicin (chemisch verwandt mit der in Aspirin® enthaltenen Acetylsalicylsäure) und die Polyphenole bedeutsam. Polyphenole sind Pflanzenstoffe mit stark antioxidativen, antientzündlichen und gewebschützenden Eigenschaften.

Chemische Schmerzmittel bewirken bei akuten Schmerzen meist eine schnelle Linderung, sie haben aber häufig erhebliche Nebenwirkungen.

Proaktiv® ist bei leichten bis mittelschweren Schmer-

Zusammensetzung

1 Hartkapsel enthält folgenden Wirkstoff:
Trockenextrakt aus **Weidenrinden** (16 - 23 : 1) 480,0 mg
Entsprechend 120,0 mg Salicin
Auszugsmittel: Wasser

Sonstige Bestandteile:
Eisen (III)-oxid E 172, Gelatine, Magnesiumstearat (pflanzlich), hochdisperses Siliciumdioxid, Titandioxid E 171, Natriumdodecylsulfat.

Darreichungsform und Inhalt

Hartkapsel
OP mit 50 Hartkapseln zum Einnehmen N2
OP mit 100 Hartkapseln zum Einnehmen N3

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

STEIGERWALD
Arzneimittelwerk GmbH
Havelstraße 5
64295 Darmstadt

Stand der Information

August 2006



zen eine wirkungsvolle und wertvolle Alternative zu chemischen Wirkstoffen. Durch die Kombinierbarkeit mit diesen eignet sich Proaktiv® auch als ergänzende Therapie, um den Verbrauch an diesen Schmerzmitteln zu senken.

Proaktiv® ist sehr gut verträglich und auch längerfristig anwendbar.

Weitere Informationen zu Proaktiv® erhalten Sie unter www.proaktiv.eu.

STEIGERWALD wünscht gute Besserung!

